

score de sévérité veineuse clinique

Développé par un Comité de l'American Venous Forum (J Vasc Surg 2000) dans le but de faciliter l'étude de l'histoire naturelle et de la gestion de la pathologie veineuse chronique des MI, ce score est basé sur 10 items, chacun coté sur 3 (0: absent, 1 mineur ou léger, 2 modéré ou moyen, 3 sévère), soit un maximum à 30.

Douleur 0 = absente	1	Occasionnelle, ne limitant pas l'activité quotidienne, ne requérant pas d'antalgique
	2	Quotidienne, limitation modérée de l'activité, prise occasionnelle d'antalgique
	3	Quotidienne, entravant l'activité, utilisation régulière d'antalgique.
Varices ¹ 0 = aucune visible	1	Quelques unes, éparses, non tronculaires.
	2	Multiples, intéressant la grande saphène au mollet ou à la cuisse
	3	Multiples, extensives, intéressant la grande et la petite saphènes, sur tout le membre
Oédème veineux ² 0 = non	1	Vespéral, limité à la cheville
	2	Apparaissant l'après-midi, dépassant la cheville
	3	Noté dès le matin, dépassant la cheville, impliquant un changement d'activité.
Pigmentation cutanée ³ 0 = non ou focalisée peu intense	1	Diffus mais limité, ocre (Dermite ocre en plaque)
	2	Diffus, distribution en guêtre (1/3 inf. de jambe) ou Pigmentation pourpre récente
	3	Très étendu (au de-là du tiers inf. de jambe) et Pigmentation récente
Inflammation 0 = non	1	Plaque d'hypodermite mineure ou Hypodermite limitée au pourtour d'un ulcère
	2	Hypodermite étendue en guêtre (1/3 inf. de jambe)
	3	Hypodermite très étendue dépassant le 1/3 inf. de jambe ou Eczéma marqué
Induration 0 = non	1	Focale, péri-malléolaire (< 5 cm)
	2	Médiale ou latérale sur moins du tiers distal de jambe
	3	Circonférentielle, guêtre impliquant le tiers distal de jambe ou plus
Ulcère(s) actif(s)/ouvert(s)	Nombre :	0 (Non)
	Evolutant depuis	1 (1 ulcère) 1 (< 3 mois)
	Plus grand diamètre	1 (< 2 cm) 2 (2 à 6 cm) 3 (> 2 ulcères) 3 (ouvert depuis plus de 1 an) 3 (> 6 cm)
Contention-Compression 0 = non utilisée, patient non-compliant	1	Portée de façon intermittente
	2	Portée la plupart du temps
	3	Portée chaque jour (compliance totale + repos en surélévation des jambes)

1. Varices d'un calibre supérieur à 4 mm

2. Oédème veineux : tendu, prenant peu le godet, exagéré par la position debout, réduit par le décubitus, quotidien

3. Hors pigmentation en regard de varices.